

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

1. למה מיועדת התרופה?

ספטול הינה תמיסה לחיטוי עור הידיים.

2. לפני השימוש בתרופה:

- ⓧ מתי אין להשתמש בתכשיר?**
- אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה.
 - אין להשתמש בתמיסה על רקמת המוח, קרום המוח או באוזן התיכונה. יש להימנע ממגע עם העיניים.
 - אין להשתמש בתכשיר אינו מהווה תחליף לכפפות סטריליות.
 - אין להשתמש בתכשיר בתינוקות מתחת לגיל חודשיים.
 - אין להשתמש בתכשיר על פצעים פתוחים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליו הודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
- במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף העיניים עם הרבה מים.
- במידה ומתפתחת נפיחות בפצע או הפצע מלווה בחום, יש להיוועץ ברופא.
- אין למהול את התמיסה או להוסיף לה חומרים כלשהם.
- אין לקרב המוצר למקורות חום או אש.
- אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד לייבוש מוחלט של התכשיר.

ⓧ תגובות בין-תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

שים לב

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. יש להימנע ממגע עם עיניים ורקמות ריריות. במקרה של מגע יש לשטוף עם הרבה מים ולפנות לרופא במידת הצורך.

אופן השימוש

לנחות השימוש מצורפת משאבה, יש להסיר את פקק הבקבוק ולהבריג את המשאבה עד לסגירה מלאה.

יש לצקת 3 מ"ל (לחיצה אחת במשאבה) מהתכשיר על ידיים נקיות, לפזר התמיסה על כל משטח העור ולחכך את הידיים עד להתנדפות מחלטת של התמיסה.

אם השתמשת במנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך. אל תגרומ להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:

- גירוי מקומי, דלקת או פריחה (נדיר): יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא.
- בכל מקרה שבו הנך מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליו להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות בילדים ובתינוקות:

- על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד.
- ראה לעיל תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות מיוחדות שפורטו.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מוחץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנוע הרעלה. אל תגרומ להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- זהירות! חומר דליק, הרחק מאש! להגן בפני אור.

תנאי אחסון:

- יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25°C.
- ניתן להשתמש בתכשיר עד 3 חודשים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה, אך לא יאחר מפג התוקף של התכשיר.

גם לפי תנאי האריזה/ההחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליו להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

Citron D30091F, D-gluconolactone, glycerin, FD&C Blue No. 1, water for injection.

בעל הרישום וכותבתו:

יצרן ובעל הרישום:
טבע מדיקל בע"מ,
ת"ד 2, אשדוד, 77100

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: מאי 2014.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 029.79.25425.00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

אשדוד מדיקל

ת"ד 2, אשדוד 77100.

08-00-19-122-05

لقائمة المواد غير الفعالة، الرجاء انظر الفقرة 6.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

سپتول هو محلول لتطهير جلد اليدين.

(2) قبل استعمال الدواء:

- ⓧ متى لا يجوز استعمال المستحضر؟**
- لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته.
 - لا يجوز استعمال المحلول على نسيج الدماغ، غشاء الدماغ أو الأذن الوسطى. يجب تجنب تماس المحلول بالعينين.
 - إن استعمال المستحضر لا يشكل بديلاً للقفازات المعقمة.
 - لا يجوز استعمال المستحضر لدى الرضع دون عمر الشهرين.
 - لا يجوز استعمال المستحضر على جروح مفتوحة.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- لا يجوز استعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة أو لفترة طويلة بدون استشارة طبيب.
- إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل استعمال الدواء.
- في حال ملامسة العينين، يجب غسل العينين بالكثير من الماء.
- في حال تطور انتفاخ في الجرح أو إذا كان الجرح متراقفاً بسخونة، يجب استشارة الطبيب.
- لا يجوز تخفيف المحلول أو إضافة أي مواد أخرى له.
- لا يجوز تقريب المنتج لمصادر الحرارة أو النار.
- لا يجوز إشعال سيجارة أو التعرض للنار حتى جفاف المستحضر بشكل كامل.

ⓧ التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

(3) كيفية استعمال الدواء؟

انتبه

لا يجوز بلع! الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط. يجب تجنب التماس بالعينين والأنسجة المخاطية. في حالة التماس يجب الشطف بالكثير من الماء والتوجه للطبيب إذا دعت الحاجة.

كيفية الإستعمال

من أجل سهولة الإستعمال أرفقت مضخة للمستحضر، يجب نزع غطاء القنبية ولولبية المضخة عليها حتى الإغلاق التام. يجب سكب 3 ملل (كبسة واحدة على المضخة) من المستحضر على يدين نظيفتين، وبعثرة المحلول على كل سطح الجلد ومن ثم فرك اليدين حتى تبخر المحلول بشكل تام.

يتبع